

アルツハイマー型認知症治療薬 効能・効果、用法・用量、薬価⁴⁾ 一覧

軽度AD

中等度AD

高度AD

アリセプト¹⁾
(軽度～中等度～高度)

投与回数:1日1回

↑ 5mg/日*
(427.5円/日)

3mg/日

0週 2週

効能・効果:アルツハイマー型認知症における認知症状の進行抑制

症状に応じて
4週間以上投与後

↑ 24mg* (12mg×2回/日)
(542.0円/日)

16mg* (8mg×2回/日)
(427.6円/日)

8mg (4mg×2回/日)

0週 2週 4週

効能・効果:軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症状の進行抑制

リバスチグミン³⁾
(軽度～中等度)

投与回数:1日1回

↑ 18mg/日*
(—)

↑ 13.5mg/日

↑ 9.0mg/日

4.5mg/日

0週 4週 8週 12週

効能・効果:軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症状の進行抑制

メマンチン²⁾
(中等度～高度)

投与回数:1日1回

↑ 20mg/日*
(427.5円/日)

↑ 15mg/日

↑ 10mg/日

5mg/日

0週 1週 2週 3週

効能・効果:中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症状の進行抑制

* 各薬剤の効能・効果に対する有効・維持用量 注) 週数は各薬剤の有効・維持用量に達するまでの期間を表す
1) アリセプトインテュフォーム 2011年1月改訂(改訂第22版)より作図
2) 平成22年12月24日付 薬事・食品衛生審議会分科会 報道発表用資料より作図
3) 平成23年3月25日付 薬事・食品衛生審議会分科会 報道発表用資料より作図
4) 平成23年3月11日付 官報より作図